

Памятка по африканской чуме свиней

Африканская чума свиней (далее – АЧС), африканская лихорадка, болезнь Монтегумери - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней всех пород и возрастов.

Для человека АЧС опасности не представляет, а для свиноводства последствия могут быть катастрофическими - поголовная гибель свиней.

Источник возбудителя инфекции - больные и переболевшие животные. Фактором передачи вируса служат: корма, подстилка, навоз, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных, продуктами убоя свиней и др.

Механическими переносчиками вируса могут быть хищные птицы, домашние и дикие животные, грызуны, насекомые паразиты (некоторые виды клещей, мухи, вши), бывшие в контакте с больными и павшими свиньями.

Заражение происходит респираторным путем через слизистые оболочки, поврежденную кожу. Вирус очень устойчив во внешней среде: при комнатной температуре сохраняется до 3-х месяцев, в замороженном мясе от 2 до 4 месяцев.

Признаки заболевания

Инкубационный период заболевания продолжается 2-6 суток, болезнь протекает молниеносно, остро и реже хронически.

В первом случае, животные гибнут внезапно, без выраженных патологоанатомических признаков. У них резко повышается температура тела, учащается пульс и дыхание.

Во втором - также повышается температура тела до 42,5°C, отмечается лихорадка, животные угнетены, одышка, кашель, появляются приступы рвоты, нервные расстройства (судороги, паралич конечностей). Наблюдаются серозные или серозно-гнойные выделения из носа и глаз.

На коже живота у основания ушей, конечностей, промежности возникают различных размеров и форм геморрагические участки (резко выражен цианоз кожи). Супоросные свиноматки, как правило, abortируют. Длительность болезни 4 -10 дней и обычно заканчивается летально.

В третьем - форма, осложненная секундарной микрофлорой, преимущественно у взрослых свиней, протекает с теми же симптомам, что и острое, но их развитие и проявление длительное и слабее выражено. В течение 6 - 8 дней удерживается высокая температура.

У большинства свиней наблюдаются признаки пневмонии, плеврит, перикардит, истощение. Через 15-25 дней больные погибают, а у выживших животных, болезнь приобретает хроническое течение или вирусоносительство.

Профилактика и меры борьбы

Эффективных средств профилактики африканской чумы свиней не разработано, лечение не предусмотрено. В случае возникновения очага

инфекции всех находящихся в нем свиней уничтожают безкровным методом, с последующим сжиганием.

На неблагополучное по АЧС хозяйство или населенный пункт накладывают КАРАНТИН.

Ввоз на ферму новых свиней допускается только через год после ликвидации болезни.

Уважаемые владельцы животных:

- обеспечьте безвыгульное содержание свиней;
- исключите использование в кормлении свиней непроверенных боенских и пищевых отходов;
- предоставляйте поголовье свиней для проводимых ветеринарной службой профилактических прививок и обработок;
- не завозите и не покупайте живых свиней, продукты их убоя, фуражное зерно и другие корма для животных без ветеринарных документов из мест неблагополучных по заболеванию АЧС.

В целях снижения экономического ущерба, причиняемого данным заболеванием, рекомендуется перепрофилирование личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств на альтернативные свиноводству направления в животноводстве (скотоводство, овцеводство и птицеводство).

О всех случаях подозрения на возникновение заболевания свиней африканской чумой свиней или падежа незамедлительно сообщайте в межрайонный Белогорский отдел Государственного ветеринарного надзора и контроля Государственного комитета ветеринарии Республики Крым по телефону: 9-10-13